

Tos ferina: ¿Qué se sabe de esta enfermedad que ataca a los peruanos?

Hasta el momento, se han confirmado 642 casos de tos ferina o tos convulsiva en el país, afectando tanto a adultos como a menores de edad, según informó César Munayco Escate, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud.

El especialista también detalló que esta enfermedad ha provocado diez fallecimientos.

De los casos reportados, 346 corresponden a niños menores de cinco años, el grupo más vulnerable ante esta afección.

LEA TAMBIÉN: CCL: Corrupción se arraiga como puerta de entrada a economías ilegales

Munayco destacó que la mayor concentración de brotes se ha registrado en la provincia del Datem del Marañón, en Loreto, específicamente en los distritos de Pastaza y Morona, donde se han concentrado el 80% de los contagios. No obstante, señaló que en las últimas tres semanas ya no se han reportado nuevos casos desde esas localidades.

Mencionó que en los distritos de Cahuapanas, Barranca, Andoas y Manceriche -también de la provincia del Datem del Marañón- "todavía tienen un número de casos que en realidad es muy pequeño en comparación a los que se tenía en Pastaza y Morona", calculando estos entre uno y dos casos por zona. "Pero ya se ha intervenido en esos lugares con vacunas", manifestó.

Debe recordarse que las autoridades regionales de salud de Loreto reportaron más de 400 casos y nueve fallecimientos a

causa de la tos ferina en esta jurisdicción.



Más de 600 personas contagiadas con tos ferina.

Otras jurisdicciones

En cuanto a otras zonas del país, Munayco refirió que en Lima se han confirmado 42 casos, en Cajamarca 22, en Cusco 17, en Arequipa 12, en el Callao 12, en Tacna nueve, en Puno ocho, en Libertad siete y en Piura seis. En Áncash se han reportado seis contagios también, en Ayacucho tres, y en Ucayali dos.

Con respecto a Lambayeque, mencionó que solo se tiene un caso confirmado. Refirió también que en esta época del año los casos de tos convulsiva o ferina suelen incrementarse, al tener un carácter “estacional”.

“Generalmente, cada tres o cuatro años hay un incremento de casos de tos ferina. Es el comportamiento estacional que tiene esta enfermedad”, manifestó.

Contagio y prevención

Por lo general, este mal alcanza a quienes no están vacunados, personas que, a su vez, van generando los contagios.

Indicó que la mejor forma de prevenir contagiarse de esta enfermedad es completar el esquema de vacunación de los niños de entre dos y seis meses, administrando luego, entre los 18 meses y los cuatro años de edad, el refuerzo correspondiente.

Las adultas gestantes también tienen que ser inmunizadas, “para que puedan transferir los anticuerpos al niño que recién a los dos meses de nacido recibirá su vacuna”.

LEA MÁS:

BCR: Demanda interna creció en 6 % durante el primer trimestre del 2025

6 peligrosos errores eléctricos que los maestros de obra deben evitar

Infraestructura inteligente: la nueva forma de entender el espacio de oficina en Perú